

EPREUVE DE DOSSIERS THERAPEUTIQUES ET BIOLOGIQUE**Dossier N° 5****Enoncé**

Mr F., âgé de 45 ans, réceptionniste, est père de 5 enfants âgés de 12 ans à 20 ans.

Ses antécédents sont : pancréatite aiguë, sevrage éthylique depuis 2002, tabagisme actif.

Mr F. présente un cancer ORL : carcinome du plancher buccal traité par chirurgie et radiothérapie.

Il subit de multiples interventions chirurgicales pour récidives.

Lors d'une consultation en ORL trois ans plus tard, Mr F. se plaint de douleurs intenses évoluant depuis 2 mois.

Des examens complémentaires font apparaître une ostéoradionécrose de la mandibule avec fistulisation à la peau.

Les douleurs sont à type d'étirement lors de la mobilisation au niveau de l'hémimandibule gauche avec une zone d'hypoesthésie en regard. Au niveau de l'hémimandibule droite, il existe une zone hypersensible avec douleur lors du rasage, de la parole et déclenchée par le froid.

Evaluation de l'intensité douloureuse : Echelle numérique 8/10 de fond et accès paroxystiques 10/10.

Son traitement comporte :

- tramadol LP 100 mg 1 cp matin et soir
- morphine LP 100 mg 1 cp à 8h et à 20h
- morphine à libération immédiate 10 mg 4 fois par jour
- amitriptyline gouttes buvables 100 mg/j
- prednisolone 20 mg 2 fois par jour
- ésomeprazole 40 mg 1 fois par jour

Le patient est très somnolent, peu soulagé. Il indique des difficultés d'observance. Il a en outre des hallucinations et une constipation opiniâtre.

Questions**QUESTION N° 1 :**

Quels types de douleurs peuvent être évoqués ?

QUESTION N° 2 :

A quelles classes pharmacologiques appartiennent les médicaments prescrits ?
Préciser leur indication chez ce patient.

QUESTION N° 3 :

Dans le tableau clinique observé chez ce patient, quels sont les effets indésirables de la morphine ?
Que faudrait-il ajouter à la prescription actuelle de Mr F. pour le(s) prendre en charge ?
Citer trois autres effets indésirables principaux de ce principe actif.

EPREUVE DE DOSSIERS THERAPEUTIQUES ET BIOLOGIQUE**Dossier N° 5****QUESTION N° 4 :**

Les interdosages de morphine à libération immédiate vous paraissent-elles adaptées ? Justifier votre réponse.

QUESTION N° 5 :

La sédation et les hallucinations devenant intolérables, quelle stratégie thérapeutique peut être proposée à Mr F. ?

QUESTION N° 6 :

Quel est le métabolite de la morphine impliqué dans ses effets indésirables ?

QUESTION N° 7 :

Le patient va mieux, plus reposé, moins énervé. Il avoue être difficilement soulagé, mais son visage est beaucoup moins crispé, il parle plus facilement. Cependant, il se plaint de troubles de la miction.

Quel(s) principe(s) actif(s) peut (peuvent) être responsable(s) de ces troubles mictionnels ?

Quelle alternative thérapeutique peut être proposée à Mr F. ?

QUESTION N° 8 :

Quel(s) est (sont) le(s) médicament(s) de la prescription initiale qui nécessite(nt) un suivi biologique ?

Préciser les examens biologiques à prescrire.